

Beplantning langs motorvejen
beplantningsbælte baseret på to principper, gældende for hele strækningen

Højderygstien
trærække af seljerøn

Udsigtspunkter
beplantning der egner sig til beskæring



Beplantning langs Dalstien
græsarealer til ophold og leg, samt trælunde og øvrig beplantning, som skaber varierede rumligheder

Regnbedsbeplantning
planter egnet til regnbede og regnvandsbassiner

Terrasseret haveanlæg
platauer af græs, samt stenhøj med subundsplanter

Skolehaven
planter til dyrknings- og undervisningsformål

Slyngplanter
til pergola



Beplantningen langs motorvejen består af to gennemgående beplantningsprincipper, der skaber vekselvirkning mellem en skovdannende karakter og græsvolden.

Principper:

1. Grupper af lave solitære træer og buske med et underliggende, åbent græsareal med overdrevskarakter.
2. Lave grupper af træer og buske med en tæt skovdannende karakter.

De to principper holdes adskilt og skaber varierede kig ind imellem beplantningen, hvilket danner dybde i landskabet og alsidighed for den kørende. Mellem de to principper strækker sig et frodigt græsareal med overdrevskarakter bestående af årstidsbestemte græsser, urter og blomster.



Frøblanding overdrev

Græsser:

Rødsvingel, *Festuca r.ssp. tricho.* S
Rødsvingel, *Festuca r.ssp. rubra.* S
Strandsvingel, *Festuca arundinacea*
Alm. Hvene, *Agrostis capillaris*
Kryb Hvene, *Agrostis stolonifera.* S
Westerwoldisk rajgræs, *L.m. westerwol*
Mosebunke, *Descampsia caespitosa*
Timoté, *Phleum bertolonii.* S

Blomster og urter:

Alm. Røllike, *Achillea millefolium*
Klinter, *Agrostemma githago*
Kornblomst, *Centaurea cyanus*
Cikorie, *Cichorium intubus*
Gulerod, *Daucus carota*
Slangehoved, *Echium vulgare*
Hvid Okseøj, *Leucanthemum vulgare*
Hvid Snerre, *Galium mollugo*
Alm. Kællingetand, *Lotus corniculatus*
Kornvalmue, *Papaver rhoeas*
Hulkraet kodriver, *Primula veris*
Dagpragtstjerne, *Silene dioica*
Blæresmelde, *Silene vulgaris*
Esparsette, *Onobrychis viciifolia*
Hundetunge, *Cynoglossum officinale*
Kongelys, *Verbascum thapsus*
Boghvede, *Fagopyrum esculentum*
Blåhat, *Knautia arvensis*

Der udsås min. 2.0 kg af græsfrøblanding pr. 100 m², hvor der iblandes 0,1 kg frøblanding af blomster og urter.





Stilkeg, *Quercus robur*

20-25 m højt træ, som ældre rundkronet med åben kronebygning og kraftige, bugtede udbredte kronegrene. Løv aflange til omvendt ægformet 5-15 cm lange blade. Bladrand med 3-6 rundagtige og uregelmæssige lapper. Frugt 2-3 cm lang agern på 4-8 cm lang stilk.

Vokseplads: Trives på næsten alle jordtyper, men foretrækker fugtighedsbevarende lermuld. Tåler byklima godt, vindfør. Anvendelse: Solitært, som gade- og vejtræ, allé, landskabsplantning, krat og hæk. Tåler hård beskæring.



Alm. Hvidtjørn, *Crataegus laevigata*

Bred, kuppet, buskagtigt træ, tæt, kroget grenbygning, oftest 2-5 m, sjældent 10 m høj. Løv ægformet, 3-5 lappet, 3-5 cm langt. Blomst hvid, rigt blomstrende, maj. Frugt ægformet, 1-1,5 cm, brunrød.

Vokseplads: Sol-halvskygge, hårdfør og vindfør. Anvendelse: Solitært, i grupper og hegn.



Rødtjørn, *Crataegus laevigata* 'Paul's Scarlet'

Moderatvoksende træ, 5-8 m højt. Lidt uregelmæssig vækst, bred kegleformet til oval krone. Løv bred ægformet, 3-5 lappet, 3-5 cm langt. Mørkegrønt, lidt lysere underside. Blomst fyldte karminrøde i rigt blomstrende halvskærme, maj-juni.

Vokseplads: Sol-halvskygge. Stiller ikke store krav til jordbunden. Hårdsom og nøjsom. Tåler byklima. Anvendelse: Solitært og i grupper. Som mindre gadetræ.



Skarlagentjørn, *Crataegus intricata*

Moderatvoksende, ofte flerstammet træ, 4-5 m højt. Løv bredt ægformet, dobbelt savtakket, 5-7 cm langt. Høstfarver er kraftige fra gul til orangerød. Blomst hvide, samlet i åbne halvskærme, maj-juni, duftende. Frugt 1-2 cm, rødbrune bær.

Vokseplads: Sol til halvskygge. Stiller ingen specielle krav til jordbunden. Tåler byklima. Anvendelse: Solitært og i grupper.



Hunderose, *Rosa canina*

Kraftig, opret busk, buede grene, store, krumme torne, 2-4 m høj. Løv friskgrønt, middelstort med 5-7 ægformede småblade. Blomst lys rosa, 4-5 cm i diameter, juni-juli. Frugt skarlagenrødt hyben, 1-2 cm, ægformet.

Vokseplads: Sol, nøjsom, hårdfør og vindfør.

Anvendelse: Grupper, hegn og vildtplantning.



Carolinarose, *Rosa carolina*

Tæt, bred. kuplet busk, ca. 1 m høj, ret små bløde torne, kraftigt rodskuddannende. Løv ret småt, matgrønt med 5 elliptiske småblade. Blomst rosa, 5 cm i diameter, juni-august. Frugt små, flade til runde, røde hyben.

Vokseplads: Sol, hårdfør og tørketålende.

Anvendelse: Busket, hæk og vildtplantning.




Æblerose, *Rose rubiginosa*

Kraftig, tæt, opret busk, 2-3 m høj, tæt tornet. Løv mørkegrønt, middelstort, 5-7 ægformede småblade, stærkt æbleduftende. Blomst lyserøde, 3 cm i diameter, juni-juli. Frugt skarlagenrød, 1,5 cm ægformede hyben.

Vokseplads: Sol, nøjsom og hårdfør.

Anvendelse: I grupper, hegn og hæk.



Blodblomme, *Prunus cerasifera 'Nigra'*

Hurtigvoksende, stærkt forgrenet med sortrøde grene, tornet busk eller træ, 5-7 m højt. Løv omvendt ægformet, 4-7 cm langt, sortrøde blade. Blomst enkle, små, lys rosa, i store mængde, april. Frugt rød, modner juli-sept.

Vokseplads: Sol, trives i enhver ikke for fugtig jord, nøjsom og vindfør.

Anvendelse: Solitært og i busket.



Naur, *Acer campestre*

Mindre træ eller stor busk, 7-15 m højt, ægformet til rund krone med uregelmæssig grenbygning. Barken er grå-gul-brun med lange ridser og kraftigt vingede korklister. Matgrøn 3-5 lappet, buttet løv. Helrandede eller butlappede afsnit, 6-10 cm langt. Lysende gule høstfarver.

Vokseplads: Meget hårdfør og skyggetålende. Ikke specielle krav til jordbund men trives bedst på muldrig og varm jord. Tåler byklima særdeles godt. Anvendelse: Solitært, hæk og landskabsplantning. Tåler hård beskæring.



Bævreasp, *Populus tremula*

Middelstort træ, variabel størrelse, dog sjældent over 10 m højt. Bredkronet med slank stamme, let uregelmæssig kroneopbygning. Løv rundagtige 3-8 cm lange. Bladoversiden matgrøn, undersiden blålig-grøn. Lysende gule høstfarver.

Vokseplads: Trives på alle jordtyper, også på meget lette jordtyper, hvor den normalt vil blive buskagtig. Robust og hårdfør. Anvendelse: Solitært, som træer i det åbne land, pionerplante m.m.



Grå-pil, *Salix cinerea*

Stor, tæt forgrenet busk, op til 5 m høj og bred. Grene dækket af bløde hår. Løv elliptisk, grå bladoverside, håret underside, 6-10 cm langt. Gule rakler før løvspring, marts/april.

Vokseplads: Sol til let skygge. Stiller ikke specielle krav til jordbunden. Frost tolerant, vindfør. Anvendelse: I grupper, busket og som pionerplante.



Båndpil, *Salix viminalis*

Bred, opret, åben busk, 5-8 m høj. Løv friskgrønt, lancetformet, 10-25 cm langt. Blomst store, gule gæslinger, marts-april.


Vokseplads: Sol-halvskygge, tåler fugtig jord, hårdfør og vindfør. Anvendelse: I grupper, hegn og læ. Anvendes som energipil.



Bredbladet Røn, *Sorbus latifolia* 'Atro'

Mindre træ, 8-10 m højt, som ung opretvoksende, som ældre pyramidal kronebygning. Grene glinsende brune. Løv elliptisk 8-10 cm lange med trekantede lapper, skarpt savtakket. Blomst hvidlige i op til 10 cm brede halvskærmede toppe, maj.

Vokseplads: Stiller ikke specielle krav til jordbunden, men er robust, hårdfør og vindfør. Klarer sig ekstremt godt i tørre sommerperioder, samt særdeles godt i belægningssarealer.
Anvendelse: Solitært, gade- og vejtræer, allé m.m.



Manchurisk Kirsebær, *Prunus maackii*

Middelstort træ, op til 10 m højt. Bred kegleformet og regelmæssig kronebygning. Stammebarken nærmest okkergul og afskallende. Løv friskgrøn overside, underside let håret. Blomst hvide, enkelte, duftende, i hængende klaser, april.

Vokseplads: Sol. Trives på de fleste jordtyper, foretrækker dog kalkholdig, næringsrig jordtype. Hårdfør og robust. Tåler byklime godt.
Anvendelse: Solitært, som gade- og vejtræ, i mindre anlæg m.m.



Hæg, *Prunus padus*

Middelstort, hurtigvoksende buskagtigt ofte flerstammet træ, 6-15 m højt. Rundagtig tætbygget krone. Løv omvendt ægformet, bladoversiden mørkegrøn og let rynket. Gulligrøde høstfarver. Blomst hvide, samlet 15-35 i udstående til hængende klaser. Sødligt duftende, maj.

Vokseplads: Sol til skygge. Trives på næsten alle jordtyper, men foretrækker fugtighedsbevarende, humusrig jord. Meget robust og hårdfør.
Anvendelse: Landskabsplantning, læplantning, skovbryn, større anlæg m.m.



Slåen, *Prunus spinosa*

Bred, tæt, tornet busk, 2-4 m høj. Løv bredt lancetformet, 2-4 cm langt, grågrøn overside, lysegrøn underside, fint savtakket bladrand. Blomst enkle, små, hvide, tæt langs alle grene, før løvspring, april-maj. Frugt lille, rund, blådugget, blommelignende.

Vokseplads: Sol, meget nøjsom, hårdfør, vindfør og tørketålende.
Anvendelse: Vildplantning, hegn og krat.



Alm. Vildæble, Malus sylvestris

Tæt, opret busk eller lille træ med kraftige grentorne, op til 7 m højt. Løv mørkegrønt, ægformet, 4-8 cm langt. Blomst rosa-hvide, duftende, sidst i maj. Frugt gul-rød, kugleformet, 2-4 cm.

*Vokseplads: Sol, nøjsom, hårdfør og vindfør.
Anvendelse: Vildplantning og hegn.*



Sargentæble, Malus sargentii

Ca. 2-3 m høj busk, vandret forgrening, sund. Løv ægformet, 3-lappet, orange-rød høstfarve. Blomst hvid, meget rigt blomstrende, maj-juni. Frugt mørkerød, kugleformet, 5-8 mm.

*Vokseplads: Sol, trives på alle alm. jordtyper, hårdfør og vindfør.
Anvendelse: I grupper, busket, hæk og hegn.*



Engriflet Hvidtjørn, Crataegus monogyna

Kraftigvoksende, ofte flerstammet kuppelformet busk eller træ, 5-10 m højt. Løv bredt ægformet, 3-5 lappet dybt indskåret. Høstfarver brun til orange. Blomst hvide til rosa, samlet i halvkærme, rigt blomstrende, maj-juni. Frugt lille rund, mørkerød.

*Vokseplads: Sol til skygge.
Meget nøjsom, hårdfør, vindfør.
Anvendelse: I grupper, som vildplantning, hækplantning, landskabsplantning, til læ m.m.
Bemærkning: Det er en frøplante, og der kan være stor spredning i vækst, blomstring m.m.*



Alm Snebær, Symphoricarpos albus

Opret, tæt, rodsuddannende, 2-2,5 m høj busk. Løv ægformet-rundt, 2-5 cm langt. Frugt hvide i små klaser, juli-december.

*Vokseplads: Sol-skygge, meget nøjsom og hårdfør.
Anvendelse: Underplantning og krat.*



Canadisk Syren, Syringa prestoniae 'Coral'

Bred busk med stive, oprette grene, ca. 3 m høj. Løv bredt ægformet, 5-15 cm langt. Blomst lys purpur.

*Vokseplads: Sol, sund, nøjsom og vindfør.
Anvendelse: Solitært, i grupper og busket.*



Dunet Gedeblad, Lonicera xylosteum

Bred, tæt busk med udbredte, stive grene, indtil 3 m høj. Løv lysegrønt, ægformet, 3-6 cm langt, håret. Blomst gullighvid, 1 cm lang, maj-juni. Frugt dekorative, røde bær, juli-sept.

*Vokseplads: Sol-skygge, uhyre nøjsom, hårdfør, vindfør og tåler fugtig jord.
Anvendelse: Busket, underplantning, læ- og vildplantning.*



Alm. Hyld, Sambucus nigra

Busk eller lille træ, 5-6 m høj. Friskgrønt, uligefinnet, 15-25 cm langt løv. Store, hvide blomsterskærme. Sorte bær i skærme, sept-okt.

*Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Sol-skygge, nøjsom og hårdfør.
Anvendelse: I grupper, underplantning og læhegn.*



Japansk Klatrerose, Rosa multiflora

Kraftig, bred, tæt, overhængende busk, 3-4 m høj, få store torne. Løv friskgrønt, 7-9 ægformede småblade. Blomst lille, hvid, i rigt-blomstrende halvskærme, duftende, juni-juli. Frugt talrige ærtestore, røde hyben i klaser, vinterstander.

*Vokseplads: Sol, nøjsom, hårdfør og vindfør.
Anvendelse: Krat og hegn.*



Dronningebusk, *Kolkwitzia amabilis*

Elegant, tæt, kuppelformet busk, opret, overhængende, indtil 3 m høj og bred. Løv lysegrønt, bredt, ægformet, 3-7 cm langt. Blomster lyserøde, klokkeformet, samlet i kvaste, rigtblomstrende, juni.

Vokseplads: Sol, stiller ingen særlige krav til jordbund, hårdfør, tåler byluft.
Anvendelse: Solitært, i grupper og busket.



Rød kornel, *Cornus sanguinea*

Hurtigvoksende, tæt, fingrenet busk, 3-4 m høj og bred. Ægformet løv, rødlig høstfarve. Små hvide blomster i skærme. Små blåsorte bær.


Blomstring: maj
Vokseplads: Sol-skygge, trives overalt, meget nøjsom og hårdfør.
Anvendelse: Vildplantning og læhegn.
Bemærkning: Orangerøde unge grene.



Fjeldribs, *Ribes alpinum* 'Hemus'

Kraftig, ca. 1,5 m høj tætforrenet busk med overhængende grene, er en sund hanklon. Løv mørkegrønt, trelappet, 5 cm langt og bredt, meget tidlig løvspring. Blomster små, gulliggrønne. Ingen frugt.

Vokseplads: Sol-skygge, trives overalt, blot ikke på meget tør jord.
Anvendelse: Underplantning og hæk.




Alm. Benved, *Euphymus europaeus*

Busk eller lille træ med oprette grene, 3-5 m højt. Mørkegrønt, elliptisk løv, 3,8 cm langt, gulrøde høstfarver. Små, grønliggule blomster, der sidder 3-5 sammen i en hængende stand. Rosarøde kapsler, orange frø.

Blomstring: maj
Vokseplads: Sol-skygge, nøjsom og vindfør.
Anvendelse: Solitært og i busket.

Langs højderygstien etableres en træ række af Seljerøn, gennemgående for hele voldens strækning. Trærækken bevæger sig skiftevis på begge sider af stien og indrammer stiens forløb, samt skaber varierende synsretninger.





Seljerøn, *Sorbus intermedia*

Middelstort træ, tæt forgrenet, 10-12 m høj og 5-7 m bred. Løv ovalt, grovt læderagtige, mørkegrønt, gulorange høstfarve. Blomst hvid, 8-10 cm brede toppe, maj/juni. Frugt orange-røde, 1 cm bred, sidder sent hen på efteråret.

Vokseplads: Solrigt, ikke særligt krlævende, men foretrækker fugtig men ikke våd jordbund. Meget frostolerant, vindstærk og god til byklima. Anvendelse: Solitært, som gade- og vejtræ, allé m.m.

Ved udsigtspunkterne er der valgt en beplantning som egner sig til kraftig beskæring for, at kunne friholde udsigtskiler. Dertil en gennemsigtelig, lav beplantning bestående af farverige, blomstrende buske med høje, åbne kroner.





Småbladet Lind, *Tilia cordata*

Noget uensartet træ, 15-25 m højt. Løv hjerteformede, kort tilspidsede 3-10 cm lange. Bladoversiden mørkegrøn og glat, undersiden blålig. Høstfarver i gule nuancer. Blomst gullighvide, stærkt sødligt duftende, samlet 5-10 kvaste. Juli.

Vokseplads: Trives bedst på næringsrig og veldrænet jordbund, men har iøvrigt stor tilpasningsevne. Absolut robust og hårdfør, tåler byluft godt. Anvendelse: Solitært, som stammet hæk, alm. hæk og til hegnbeplantning. Tåler kraftig beskæring.



Rødeg, *Quercus rubra*

Kraftigvoksende 20-30 m højt træ med rundagtig kronebygning, kraftig stamme med horisontale sidegrene. Løv aflangt elliptisk, fjerlappet, 12-22 cm langt, mat mørkegrønt, høstcolorittet strækker sig over en lang periode og varierer mellem orange-skarlagentrødt og rødbrunt.

Vokseplads: Stiller ikke store krav til jordbunden, men trives bedst på lette og veldrænedede jordtyper. Trives kun optimalt på sur jord, hvor PH-værdien ikke overstiger 5,5. Anvendelse: Solitært, i grupper, allé, krat og hæk. Tåler hård beskæring.



Alm. bærmispel, *Amelanchier lamarckii*

4-8 m høj, flerstammet busk med opret, bred paraplyformet kronet. Ofte bredere end høj. 3-8,5 cm langt, elliptisk løv, unge blade kobberøde. Stærk gul, orange til røde høstfarver. Hvide, stjerneformede blomster i oprette klaser.

*Blomstring: april
Frukt: Blåsorte, spiselige bær.
Vokseplads: Sol til let skygge. Trives på normal kultiveret jord, sur til let kalkholdig, moderat tør til fugtig. Generelt ikke særlig krævende. Anvendelse: Solitært og i grupper. Bemærkninger: Rigt blomstrende.*




Troldnød, *Hamamelis mollis*

Opret, åben busk, 3-4 m høj. Løv ægformet, næsten rundt, 8-15 cm langt, filtet. Gulorange høstfarver. Blomst frynset, guldgul, duftende, januar-april.

Vokseplads: Sol-halvskygge og læ, luftig ikke for tør jord, tåler byluft. Anvendelse: Solitært og i grupper.

Beplantningen på voldens skråning der henvender sig mod boligkvarteret præges af en parklignende beplantning med åbne græsarealer, som kan bruges til ophold, boldspil m.m. Beplantningshegn og grupper, som åbner og lukker sig og som til tider danner tag over dalstien med sammenvoksende trækroner. Dertil trælunde af henholdsvis Magnolie, Birk, Kirsebær og Hjertetræ, som skelsætter sig fra anden beplantning ved, at stå grupperet i forskellige beplantningsmønstre, bestående udelukkende af samme art og sort. Således bidrager lundene til særligt farverige, blomsterrige og rumlige oplevelser langs Dalstien.





Japansk Magnolie, *Magnolia kobus*

Bredt, kegleformet træ, indtil 10 m højt. Løv mørkegrønt, elliptisk, 10-15 cm langt. Blomst opret, hvid, stjerneformet, duftende, ca. 10 cm bred, meget rigt blomstrende, april. Frugt cylindrisk, rosafarvet kapsel.

*Vokseplads: Lun, solrig, dybmuldet jord, sut til neutral jord.
Bemærkning: Solitært.*



Himalajabirk, *Betula utilis*

Mellemstort ofte flerstammet træ, 10-15 m højt. Krone bred kegleformet med let opbygning. Barken skinnende hvid, afskallende papirtyndt. Løv spidst ægformet, savtakket 5-8 cm langt. Blankt mørkegrønt med lysende guldgule høstfarver. Hanrakler, gulgrønne i maj.

*Vokseplads: Sol. Stiller ikke specielle krav, men trives bedst med lav til neutral PH-værdi.
Anvendelse: Solitært og i grupper i større anlæg. Endvidere som pionerplante.*



Japansk Prydkirsebær, *Prunus subhirtella* 'Hally Jolivette'

Lille rundkuppet træ med tæt forgrenet og fingrenet krone, 3-5 m høj. Løv spids-ovalt, 5-7 cm lange, gule høstfarver. Blomst Hvide til svagt rosa, tætfyldte, maj. Varer i op til 4 uger, rigt blomstrende.

*Vokseplads: Trives bedst i fuld sol, trives på de fleste jordtyper.
Anvendelse: Solitært.*



Hjertetræ, *Cercidiphyllum japonicum*

Mindre træ, ofte flerstammet, 7-10 m højt. Bred pyramidal vækst og meget dekorativt finkvistet. Hjerteformet løv, i udspring er farven bronze til rødlige nuancer. Bladoversiden lys friskgrøn. Høstfarver i flotte gule til rødlige nuancer.

*Vokseplads: Sol. Trives bedst i dybmuldet og fugtighedsbevarende, næringsrig jordbund. Udvikler sig bedst i beskyttet vokseplads.
Anvendelse: Solitært og i grupper, gårdhaver m.m.
Er på grund af sin naturlige vækst mest velegnet som flerstammet.*



Fuglekirsebær, *Prunus avium*

Stort kraftigvoksende træ, 15-25 m højt. Gennemgående stamme, tværstribet bark der løsner sig i ringformede flager. Løv mørkegrøn med dobbelt savtakket bladrand. Blomster renhvide, enkelte, rigtblomstrende, maj.

Vokseplads: Sol. Trives på de fleste jordtyper, foretrækker dog kalkholdig, næringsrig og ikke fugtig jordbund. Robust og hårdfør.
Anvendelse: Solitært, som gade- og vejtræ, landskabsplantning, skovplantning m.m.



Japansk Røn, *Sorbus commixta*

Lille smalt opretvoksende træ, indtil 7 m højt. I løvspring kobberfarvede, senere gråligrønne med blågrøn bladunderside, midterstribe skarlagenerød. Høstfarver meget iøjenfaldende gule og røde farver. Blomst gullighvide, juni. Frugt i klaser, sept.

Vokseplads: Stiller ikke specielle krav til jordbunden, men trives som andre røn bedst på kalkholdig jord. Robust og hårdfør.
Anvendelse: Solitært, som gade- og vejtræ, allé m.m.



Papegøjebusk, *Parrotia persica*

Langsom vækst, åben, bredtvoksende busk, 5-6 m høj, 6-10 m bred. Løv lysegrønt, elliptisk, 8-12 cm langt. Først i oktober til hen i november farves løvet pragtfuldt gyldent, orange og skarlagenerødt.

Vokseplads: Lun-solrig, normal veldrænet og næringsrig jord.
Anvendelse: Solitært og i grupper.






Vårguld, *Forsythia intermedia*

Opret vækst, bred busk, rigt forgrenet, 2-3 m høj. Løv elliptisk, mørkegrønt, 5-8 cm langt. Blomst mørkegul, åben, klokkeformet, rigtblomstrende lige før løvspring.

Vokseplads: Sol-halvskygge, trives i al slags jord, blot den ikke er udpræget tør eller fugtig.
Anvendelse: Solitært, i grupper og busket.

Planter egnet til regnbede og regnvandsbassiner med beskrivelse af hvor de specifikke planter kan placeres ift. oversvømmelsesforhold. Beplantningens formål er, at skabe frodighed, stor artsdiversitet og varierende rumlige forløb, som tager sig ud efter vandets dynamik. Beplantningen består af middelstore træer og buske, som er både blomstrende, frugtgivende og med høstfarver. Langs regnbeds-/bassinets vandkant strækker sig en årstidsbestemt, stærkt blomstrende eng med stauder i varierende højder - fra krybende til 1,5 m høj. Græsserne er næsten buskadsagtige med deres tuedannede vækst, mellem 30-150 cm høj og er den primære vinterstander.

Regnbedsbeplantningen forventes at præge hele strækningen langs dalstien i mere eller mindre grad.





Sortbirk, *Betula nigra*

12-15 m højt træ. Open krone med oprette hovedgrene og overhængende sidegrene som ældre. Bark let brunrød og sølvgrå som ældre med oprullede flager fastblivende på stammen. Ovalt 3-10 cm langt løv, skinnende grønne med grå underside. Høstfarver strålende gul.


Vokseplads: Foretrækker fugtige jorde, men trives også på moderat tørre jorde. Meget frost tolerant, tåler midlertidig oversvømmelse. Anvendelse: Solitært, i grupper, som pionertræ.



Kaspisk pil, *Salix acutifolia*

Stor, åben busk, med slanke, buede grene, 4-5 m høj. Glinsende mørkegrønt løv, lancetformet med fint savtakket bladrand, 8-10 cm langt.

Blomstring: Sølvgrå gæslinger, februar-april. Vokseplads: Sol-skygge, tåler vind og let jord. Anvendelse: Solitært, i grupper og hegn.



Seljepil, *Salix caprea*

Op til 10 m høj, kraftigvoksende, stor busk eller lille træ. Ungeskud er hårede, senere glatte og rødbrune. Bredt elliptisk løv, 5-10 cm lange med matgrøn rynket overside.


Blomstring: Rakler før løvspring med guldgule støvknapper. Vokseplads: Trives på stort set alle jordtyper, nøjsom og robust. Anvendelse: Skovbryn, hegn og krat.



Ægte dugpil, *Salix daphnoides*

Opret, udstående krone, 6-8 m højt. Rødviolette, blåduggede grene. Glinsende, mørkegrønt, aflangt, elliptisk løv, 8-10 cm langt. Gullige til orange høstfarver.

Blomstring: Sølvgrå gæslinger, marts-april. Vokseplads: Sol-halvskygge, nøjsom, hårdfør og vindfør, ynder sandet jord. Anvendelse: Solitært, i grupper og læhegn.



Alm. Røn, Sorbus aucuparia

5-15 m højt træ. Ofte flerstammet, med oval til rund krone. Uligefinnet 15-20 cm langt løv, sammensat af 9-15 aflangt lancetformede småblade. Høstfarver gul-orange til rødlige nuancer. Korallrøde frugter, 0,8 cm i diameter, modner i aug/sep

Blomstring: S sammensat i indtil 15 cm store halv-skærmformede toppe, gullighvide, maj - juni
Vokseplads: Stille ikke store krav. Trives optimalt på næringsrig, let sur humusjord. Vindfast og robust, tåler byklima særdeles godt.
Anvendelse: Solitært, i blandede beplantninger.



Alm. Konvalbusk, Clethra alnifolia

Medium stor busk, 2-3 m høj, først stiv, opret, senere oval til rund form. 4-10 cm lang løv, omvendt ægformede, savtakket rand, lysegrøn til grøn. Bleg gul til rødbrun høstfarve. Hvide blomster, 15 cm lange i oprette klaser. Velduftende

Blomstring: juli - september
Vokseplads: Sol-skygge, læ. Foretrækker fugtig til våde, sure og humus-rig jord, ikke lerede.
Anvendelse: I busket



Mosepors, Myrica gale

Op til 2,5 m høj, stiv, opret lille busk. Stærkt forgrenet. Omvendt ægformet løv, 3-6 cm langt, mat grønne med stærk aroma ved knusning. Hanrakler er ravfarvet ved fuld flor, 1-1,5 cm lange. Hunrakler 0,5 cm lange, dukker op før løvspring.


Blomstring: april - maj
Vokseplads: Sol, trives på fugtige til våde, næringsfattige eller sandede, humusrige, sure jorde. Frosttolerant.
Anvendelse: I busket.



Skinnende rose, Rosa nitida

Tæt, fingrenet, kuplet busk, 50-70 cm høj, røde børstetorne, kraftigt rodskuddannende. Små, 7-9 elliptiske små-blade, glinsende, mørkegrønt, 1-3 cm langt. Karminrøde høstfarver. Mørkerosa blomster, 4-5 cm.

Blomstring: juni - juli
Frugt: Skarlagenrødt, 1 cm rundt hyben. Bliver på busken langt ind i vinteren.
Vokseplads: Sol, nøjsom, hårdfør og vindfør, tåler en del fugtighed.
Anvendelse: Velegnet til bunddække, krat og fritidsgrunde.



Storfrugtet blåbær, *Vaccinium corymbosum*

Lille 1-2 m høj og bred busk. Stiv, opret forgrening. Langsomvoksende. Ovalt til lancetformet løv, grønne blade. Høstfarver gul til orangerød. Hvide til lyserøde blomster, i tætte klynger. Kugleformet frugt, op til 1,5 cm i diameter.

Blomstring: maj
Frugt: Blåsort, smager sødt.
Vokseplads: Sol til delvis skygge.
Fugtige til våde, humusrig jord.
Trives på humusrig sandet jord, lettere næringsfattig. Frosttolerant, fortrækker kølige, fugtige steder.
Anvendelse: I busket.



Alm. Kvalkved, *Viburnum opulus*

4 m høj, stor, bred, asymmetrisk, busk. Hurtigvoksende. 3-5 fliget løv, 8-12 cm lange, lysegrønne blade med grågrøn, håret underside. Høstfarver vinrød til orange-rød. Hvide blomster, 8-10 cm brede, flade toppe omringet af buketter.

Blomstring: maj - juni
Frugt: Rød, op til 1 cm i diameter, skinnende og vinterstander.
Vokseplads: Sol til delvis skygge.
Fugtige til våde, næringsrig, mild sur til stærk kalkholdig jord.
Frosttolerant, intolerant overfor varme og tørke. Vindtolerant.
Anvendelse: I busket.



Engkarse, *Cardamine pratensis*

40 cm høj. Hvide til lyserøde blomster.

Blomstring: april - juni
Vokseplads: Fuld sol. Trives i fugtig til våd jord. Tåler oversvømmelse.
Anvendelse: 10-15 pr.m²



Hjortetrøst, *Eupatorium*

120 cm høj. Oprette stilke med tætte blade. Støvet lyserøde til rødbrune blomster. Vinterstandere.

Blomstring: juli - september
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Trives i fugtig til våd jord.
Anvendelse: 2-3 pr m²
Bemærkning: Visne toppe klippes ned om foråret.



Mjødurt, Filipendula

80 cm høj, kuplet, opretvoksende.
Finnede blade. Lyserøde blomster i
blomsterskærm toppe.




Engnellikerod, Geum rivale

35 cm høj. Nikkende, klokkefor-
mede, lyserøde til gule blomster på
røde stilke, vinrøde bægerblade.



Daglilje, Hemerocallis

90 cm høj, kuplet vækst. Græs-
lignende løv. Smalle. Tragtformede
gule blomster med stærk duft.



Gul iris, Iris pseudoacorus

100 cm høj. Sværdformede blade.
Gule blomster.

*Blomstring: juli - august
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Trives i fugtig til våd jord.
Anvendelse: 3-6 pr m²*

*Blomstring: april - juni
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Trives i fugtig til våd jord.
Anvendelse: 9-15 pr m²*

*Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Trives i fugtig til våd jord.
Anvendelse: 3-4 pr m²*

*Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Sol til halvskygge,
ikke særlig krævende. Trives i
fugtig til våd jord. Tåler oversvøm-
melse.
Anvendelse: 4-8 pr m²*




Sibirisk iris, *Iris sibirica*
70 cm høj, kuplet vækst. Smalle sværdformede blade, blåviolette blomster.



Alm. fredløs, *Lysimachia vulgaris*
60-90 cm høj. Busket, opret med korte udløbere. Gule blomster i aks, blomstrende del opret, knopdelen nikkende



Alm. kattehale, *Lythrum salicaria*
80 cm høj, kuplet, opret vækst. Lilla-lyserøde blomster. Vinterstandere.



Eng-forglemmigej, *Myosotis palustris*
15-20 cm høj, opstigende vækst. Blå blomster.

Blomstring: maj - juni
Vokseplads: Fuld sol. Trives i fugtig til våd jord. Tåler oversvømmelse.
Anvendelse: 5-9 pr m²

Blomstring: juni - august
Vokseplads: Sol til halvskygge. Trives i fugtig til våd jord. Tåler oversvømmelse.
Anvendelse: 7-10 pr m²

Blomstring: juni - august
Vokseplads: Sol til halvskygge. Trives i fugtig til våd jord.
Anvendelse: 5-7 pr m²
Bemærkning: Visne toppe klippes ned om foråret.

Blomstring: maj - september
Vokseplads: Sol til halvskygge. Foretrækker fugtig jord.
Anvendelse: 6 pr m²



Bronzeblad, Rodgersia

100 cm høj. Bronzefarvet løv. Hvide blomster i løse, forgrenede toppe.



Morgenstjerner, Carex grayi

30-60 cm høj. Tuedannende. Oprette, bleggrønne stjerneformede aks. Stedsegrønne blade.



Palmebladet star, Carex muskingumensis

50-70 cm høj. Tuedannende, tætte skud og finbladet. Grønne blade med hvide kanter. Bladene bliver brunlige om efteråret.



Kæmpe star, Carex pendula

60-140 cm høj. Mørkegrønne, iøjefaldende, bredbladede tuer med hvælvede blomster. Aksene er cylindriske og sidder på lange op til 1,5 m. Høje overhængende strå. Aflange grønne blade.

Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Delvis skygge til fuld skygge
Anvendelse: 1-3 pr m²

Blomstring: juni - september
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Fugtig til våd jord
Anvendelse: Velegnet som bunddække, 5-7 pr m²
Bemærkning: Hvis bladene er blevet frostskaadet i vinterens løb, klippes de tilbage om foråret.

Vokseplads: Trives bedst i sol.
Fugtig til våd jord, tåler at blive oversvømmet.
Anvendelse: Velegnet som bunddække, 5-7 pr m²
Bemærkning: Klippes ned om foråret.

Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Delvis skygge til skygge. Våd jord, tåler at blive oversvømmet.
Anvendelse: 2-3 pr m²
Bemærkning: Klippes ned om foråret.



Trævelekrone, Lychnis flos-cuculi

40 cm høj. Blå-lyserøde blomster.




Kæmpeprimula, Primula florindae

50 cm høj. Store, blege gule blomster.



Stor Tusindstråle, Telekia speciosa

150 cm høj. Dekorativt løv og gule blomster buketter.



Hosta, Hosta

50-70 cm høj. Irregulære hvidrandede blade. Violette blomster.

*Blomstring: maj - juni
Vokseplads: Fuld sol. Trives på fugtig jord.
Anvendelse: 12-15 pr m²*

*Blomstring: juli - august
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Trives på fugtig jord.
Anvendelse: 9-12 pr m²*

*Blomstring: juni - august
Vokseplads: Halvskygge til sol.
Ikke særlig krævende. Trives på fugtig jord.
Anvendelse: 2-3 pr m²
Bemærkninger: Selvsående.*

*Blomstring: juli
Vokseplads: Delvis skygge til skygge. Robust staude.
Anvendelse: 3-5 pr m²*



Storfrugtet surbær, Aronia melanocarpa

Opret, spinkel busk, 1,5-2 m høj. Mørkegrønt, elliptisk løv, 6-10 cm langt, kraftig rød høstfarve. Hvide til lyserøde blomster, i små toppe. Små, runde bæræbler, mørkerøde til sorte.

Blomstring: juni
Vokseplads: Sol-halvskygge, trives på både fugtig og tør jord, hårdfør og vindfør.
Anvendelse: I busket og underplantering.



Blærespirea, Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

Kraftigvoksende, tæt og opret busk, op til 3 m høj og bred. Løv 3-lappet, 5-10 cm langt, mørkerødt. Blomst hvide til sart pink, samlet i halvskærme.

Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Sol-skygge, trives på næsten alle jordtyper. Tolererer frost, byluft og vind. Robust.
Anvendelse: I busket, hvor man ønsker at bruge den markante mørkerøde løv.



Ægte stormhat, Aconitum napellus

110 cm høj, forgrenet ved basis, stiv opret vækst. Dybt skåret blade. Mørkeblå blomster.

Blomstring: juli - august
Vokseplads: Halvskygge til sol.
Fugtig jord.
Anvendelse: 6-8 pr m²



Lodden løvefod, Alchemilla mollis

35 cm høj, kuplet vækst. Runde, fligede blade. Uanselige grøngule blomster.

Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Fugtig til våd jord. Velegnet som bunddække.
Anvendelse: 5-7 pr m²
Bemærkning: Robust staude.



Alm. Akeleje, Aquilegia vulgaris

60 cm høj. Kortansporede blomster, mørkeblå, violette, lyserøde og hvide.



Nyengelsk asters, Aster novae-angliae

150 cm høj, stiv opret vækst. Behårede blade. Lyserøde-violette blomster.



Stor stjerneskærm, Astrantia major

70 cm høj. Sølv-hvide blomster med lyserøde aftegninger.



Alm. Duehoved, Chelone obliqua

90 cm høj, stiv, opret vækst. Brændenælde-agtigt løv. Rørformet, oppustede blå-lyserøde blomster. Vinterstandere.

*Blomstring: maj - juni
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Fugtig jord.
Anvendelse: 9-12 pr m²*

*Blomstring: september - oktober
Vokseplads: Fuld sol. Fugtig jord.
Anvendelse: 2-3 pr m²*


*Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Sol til halvskygge.
Fugtig til våd jord.
Anvendelse: 6-9 pr m²*

*Blomstring: juli - september
Vokseplads: Sol til delvis skygge.
Fugtig til våd jord.
Anvendelse: 4-7 pr m²
Bemærkning: Visne toppe klippes ned om foråret.*




Gul Lærkespore, Corydalis lutea

20 cm høj. Gule blomster.



Purpursolhat, Echinacea purpurea

80-100 cm høj, stiv, opret. Lillarøde blomster på stilke. Vinterstandere.



Engstorkenæb, Geranium pratense

60 cm høj, kuplet, løs opretvoksende vækst. Blege blåviolette blomster.



Langakset pragtskær, Liatris spicata


80 cm høj. Former græslignende tuer med stive, oprette violette-lyserøde blomster.

Blomstring: maj - oktober
Vokseplads: Delvis skygge til fuld skygge.
Anvendelse: 10-12 pr m²

Blomstring: august - september
Vokseplads: Fuld sol. Fugtig jord.
Anvendelse: 6-9 pr m²
Bemærkning: Selvsående. Visne toppe klippes ned om foråret.

Blomstring: juni - september
Vokseplads: Sol til delvis skygge.
Fugtig jord.
Anvendelse: 5-8 pr m²

Blomstring: juli - august
Vokseplads: Fuld sol. Fugtig jord.
Anvendelse: 7-12 pr m²



Hestemynte, Monarda didyma
90-120 cm høj. Lilla blomster.



Vårfloks, Phlox divaricata
30 cm høj. Forårsblomstrene med blege blå blomster.



Drejeblostm, Physostegia virginiana
80 cm høj, stiv, opret vækst med udløbere. Slanke blomster i spidser, violet-lyserøde.




Virginsk ærenpris, Veronicastrum virginicum
160 cm høj. Blade i hvirvler. Meget slanke blå blomster i spidser. Vinterstandere.

*Blomstring: juni - august
Vokseplads: Fuld sol. Fugtig jord.
Anvendelse: 4-7 pr m²*

*Blomstring: maj - juni
Vokseplads: Fuld sol til delvis skygge. Fugtig jord.
Anvendelse: 7-9 pr m²*

*Blomstring: juli - september
Vokseplads: Fuld sol til delvis skygge. Fugtig jord.
Anvendelse: 5-7 pr m²*

*Blomstring: juli - august
Vokseplads: Fuld sol. Fugtig jord.
Anvendelse: 3-4 pr m²
Bemærkning: Visne toppe klippes ned om foråret.*



Skinnende solhat, Rudbeckia fulgida

70 cm høj. Korte udløbere. Håret løv. Gule blomster med sort knap, stive stilke. Vinterstandere.



Ru gyldenris, Solidago rugosa

150 cm høj. Bred, opretvoksende. Gule, løst forgrenede blomster toppe.



Bredbladet spidsgræs, Chasmanthium latifolium

70-90 cm høj. Tuedannende, busket, opret, blege grønne, flade toppe.



Kinesisk elefantgræs, Miscanthus sinensis

130-150 cm høj. Tætte tuer af fine blade, få blomster. Smalle, grønne blade med tynde hvide længedribler. Bladene bliver brunlige om efteråret.

*Blomstring: juli - september
Vokseplads: Fuld sol. Fugtig jord.
Anvendelse: 5-9 pr m²
Bemærkning: Robust staude.
Selvsående. Visne toppe klippes ned om foråret.*

*Blomstring: august - oktober
Vokseplads: Fuld sol. Fugtig jord.
Anvendelse: 3 pr m²*

*Vokseplads: Sol-halvskygge.
Fugtig jord.
Anvendelse: 5-7 pr m²
Bemærkning: Klippes ned om foråret.*

*Vokseplads: Fuld sol. Fugtig jord.
Anvendelse: 1-2 pr m²
Bemærkning: Klippes ned om foråret.*



Askbladet løn, Acer ne-gundo

Hurtigvoksende ofte flerstammet træ, 15-20 m højt. Bredkronet med åben grenbygning. Bark er som ung grøn, senere blålig. Lysegrønt 3-5 koblet løv, 5-10 cm langt. Gule høstfarver. Gullig-hvide blomster i klaser. Vinget, brunlig frugt.

Blomstring: Tidlig forår, marts/april
Vokseplads: Sol til halvskygge og helst i læ. Trives godt i lermuldet og kalkrig jord. Tåler tørke og byklima godt.
Anvendelse: Solitært og i grupper. Hvor der er god plads også som gadetræ.



Alm. Tretorn, Gleditsia triacanthos

12-20 m højt træ. Kronen flad, etagedelt. Rødbrune blanke, buede torne på grene og stamme. Finnet løv, 14-20 cm langt med 20-30 lancetformede småblade. Lysegrønt med guldgule høstfarver. Frø i 20-40 cm lange bælg, mørkebrune.


Blomstring: Lysegrønne i små klaser, juni - juli.
Vokseplads: Sol. Trives i let og velnæret, varm og kalkholdig jord. Tåler byklima og tørke.
Anvendelse: Solitært og i grupper, som bytræ.
Bemærkning: Sent løvspring, juni. Letløvet, stor lysgennemgang.



Søjleasp, Populus tremula 'Erecta'

Tæt søjleformet træ med oprette grene, noget uregelmæssigt vækstforløb, 12-15 m højt. Rundagtigt 3-8 cm lange, matgrønt løv. Lysende gule høstfarver.

Vokseplads: Trives på alle jordtyper. Hårdfør og robust.
Anvendelse: Solitært eller som allé, eller i øvrigt hvor man ønsker at udnytte virkningen af den specifikke vækst.



Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum

25 cm høj, bred forgrenet vækst.

Blomstring: maj - juni/september
Vokseplads: Sol til halvskygge. Tør jord.
Anvendelse: 4-9 pr m²



Fransk blåmunke, *Jasione laevis*

40 cm høj, svage udløbere, løv i roset. Blå blomster i små hoveder.




Løvehale, *Phlomis russeliana*

110 cm høj. Meget dekorative gule blomster. Vinterstandere.



Sct. Hansurt, *Sedum telephium*

50 cm høj, kuplet. Brunrøde blomster i flade stande. Vinterstandere.



Dagpragtstjerne, *Silene dioica*

15 cm høj. Små, grønhvide oppustede "calyces" over grågrønt græstørv.

Blomstring: juni - august
Vokseplads: Fuld sol. Tør, næringsfattig og sur jord.
Anvendelse: 8-12 pr m²

Blomstring: juni - juli
Vokseplads: Fuld sol til delvis skygge. Tør jord.
Anvendelse: 3-6 pr m²
Bemærkning: Visne toppe klippes ned om foråret.

Blomstring: august - oktober
Vokseplads: Sol til halvskygge, tørketålende. Tør jord.
Anvendelse: 6 pr m²
Bemærkning: Visne toppe klippes ned om foråret.

Blomstring: juni - august
Vokseplads: Fuld sol. Tør, sandet jord.
Anvendelse: 12-15 pr m²



Aksærenpris, Veronica spicata

30 cm høj. Klumpformet vækst. Blomster opretvoksende i slanke blå spidser.

*Blomstring: juli - august
Vokseplads: Fuld sol. Tør, kalkholdig, sandet jord.
Anvendelse: 7-12 pr m²*



Rørhvene, Calamagrostis x acutifolia

60-150 cm høj. Tuedannende, stiv og tæt, opret. Slanke gule toppe er brunorange om efteråret. Grønne blade, der bliver brunlige om efteråret.

*Vokseplads: Fuld sol. Tør til fugtig jord.
Anvendelse: 2-3 pr m²
Bemærkning: Klippes ned om foråret.*



Alm. Blåtop, Molinia caerulea

30-80 cm høj. Oprette blomster stængler, gylden brun høstfarve. Blomsterne er standhaftige i stråene, og har derfor også prydværdi om vinteren.

*Blomstring: august - september
Vokseplads: Sol-halvskygge.
Fugtige til tørre, kalkholdige jorde.
Anvendelse: 5-7 pr m²
Bemærkning: Klippes ned om foråret.*




Præriehirse, Panicum virgatum

60-150 cm høj. Stiv, opret. grønne blade, senere gullige om efteråret.

*Vokseplads: Fuld sol. Tør til fugtig jord.
Anvendelse: 2-3 pr m²
Bemærkning: Klippes ned om foråret.*

Det terrasserede haveanlæg består af grønne græsplatauer, som danner ophold på forskellige niveauer af volden. Det er et åbent anlæg med en overordnet gennemsigtelig og lav beplantning. En del af det terrassede haveanlæg fungerer som sten-
høj med en surbundsbeplantning som er stærkt vintergrøn og en let men høj beplantning af nåletræer.





Japansk Lærk, Larix kaempferi

Åbent, bredt kegleformet træ, kun let skyggende, 20-25 m højt, årlig tilvækst 30-40 cm. Blågrønne, bløde nåle, løvfældende, pragtfuld gul efterårsfarve. Frugt dekorative, røde, senere brune rosetformede, 3 cm lange kogler.

*Vokseplads: Sol-halvskygge, normal tør-fugtig jord.
Anvendelse: Solitært, i grupper, til hæk og skov.*



Rhododendron, Rhododendron impeditum 'Azurika'

Langsomtvoksende, kompakt rund og tæt forgrenet dværgbush, op til 0,7 m høj og op til 1 m bred. Løv, ovalt, mørkegrønt og blankt. Blomster mørkeviolet/blå, maj. Stedsegrøn.

*Vokseplads: Sol til let skygge. Stiller ikke specielle krav, men trives på fugtige humusrige jorde, som er let-meget sure. Meget hårdfør.
Anvendelse: Busket. Stedsegrøn.*



Bjergte, Gaultheria procumbens

Tæppedannende, 15 cm høj, breder sig med rodsrud. Løv elliptiske 1,5-3,5 cm blanke, læderagtige, grønne med grågrøn underside, rødlig om vinteren. Blomst hvide, nikkende, juni-august. Frugt runde mørkerøde, glinsende, duftende.

*Vokseplads: Sol-halvskygge, surbund (spagnum)
Anvendelse: Busket, underplantning i surbundsbede el. lign.
Stedsegrøn.*



Fjældris, Kalmia procumbens

Krybende bunddække, op til 10 cm højt. Løv stedsegrønne, læderagtige, modsatrettede, grønne blade. Blomst små, pinke, kronformede, juni-august.

*Vokseplads: Sol til let skygge.
Anvendelse: Busket, underplantning i surbundsbede el. lign.
Stedsegrøn.*



Hedemelbærris, *Arctostaphylos uva-ursi*

Krybende bunddækkende, 0,15-0,25 m høj. Løv stedsegrønt, stærkt læderagtig, 1-3 cm lange, mørkegrønne blade. Blomster små, pinkhvide, klokkeformede, april/maj. Frugt skarlagenrøde, spiselige bær på størrelse med ærter.


Vokseplads: Sol til let skygge. Frost tolerant. Anvendelse: Busket, underplantning i surbundsbede el. lign. Stedsegrøn.



Myrtekrukke, *Pernettya mucronata*

Opret, tætforgrenet, 0,5-1,5 m høj busk. Løv stedsegrønne, små grønne, læderagtige blade. Blomst hvide og pinke, enkelte, krukkeformede, maj-juni. Frugt hvide, runde, giftige bær, 1,2 cm i diameter. Sidder i klynger for enden af skud.

Vokseplads: Sol til let skygge, læ. Sur jordbund. Anvendelse: Busket, underplantning i surbundsbede el. lign. Stedsegrøn.



Skimmia, *Skimmia japonica 'rubella'*

Opret, kompaktvoksende busk, 50-80 cm høj. Løv stedsegrønt, 6-12 cm lange, tykke, læderagtige, mørkegrønne med smal rød kant, rødlig stilke. Blomst cremefarvede, 10-12 cm toppe i april-maj, rødbrunde knopper.

Vokseplads: Halvskygge til skygge, humusrig fugtighedsbevarende jordbund. Anvendelse: Busket, underplantning i surbundsbede el. lign. Stedsegrøn.



Tyttebær, *Vaccinium vitis-idaea*

Lavtvoksende, 5-25 cm høj busk. Løv omvendt ægformet og helrandede, små grønne blade. Blomst hvid eller rosa i små overhængende klaser ved skudspidserne, klokkeformede. Frugt skinnende røde bær, sidder langt hen på vinteren.

Vokseplads: Nogen skygge og forholdsvis tør, sur jordbund. Anvendelse: Busket, underplantning i surbundsbede el. lign. Stedsegrøn.

Planter til dyrknings- og undervisningsformål, bestående af frugttræer og buske, spiselige rodfrugter, salater, urter m.m.



Salat, kål, rodfrugter og urter

- Prydjordbær
- Rabarber
- Rosmarin
- Bredbladet Salvie
- Purløg
- Gulerødder
- Brune ærter
- Grønne bønner
- Radiser
- Rødbeder
- Spidskål
- Purpurkål
- Porrer
- Spiseløg
- Kartoffel
- Persille
- Dild
- Merian
- Oregano
- Citronmelisse
- Pebermynte
- Tallerkensmækker
- Solsikker





Blomme, *Prunus domestica* 'Reine Claude'

Kraftig, bred, sund og hårdfør. Frugt middelstor, fin spiseblomme, god til konservering, rund, gulgrøn med røde prikker. Moderatbærende. Selvbestøvende og alle øvrige blomler.

Vokseplads: Solrigt. Stiller ikke specielle krav, men trives ikke på en vandlidende jordbund. Anvendelse: Frugttræ.



Ferskenabrikos, *Prunus armeniaca* 'Nancy'

Moderatvoksende. Bedste abrikos for dansk forhold. frugt ret stor, orangegul med rødpletet solside, rigtbærende, spiselig. Selvbestøvende.

Vokseplads: Solrigt. Stiller ikke specielle krav, men trives ikke på en vandlidende jordbund. Anvendelse: Frugttræ.



Surbær, *Aronia melanocarpa* 'Aron'

Tæt, opret ca. 1,5-2 m høj og spinkel busk. Løv mørkegrønt, elliptisk, 6-10 cm langt. Gul-røde høstfarver. Blomst hvid-lyserøde i små toppe, juni. Frugt store, runde, sorte bæræbler. Rigtbærende spiselige frugter.

Vokseplads: Sol, særdeles vindstærk, tåler tørke og en del salt. Anvendelse: Busket og underplantering.



Solbær, *Ribes nigrum* 'Tintania'

Kraftigtvoksende, opret busk, op til 2 m høj. Meget modstandsdygtig over for meldug. Frugt store, sorte, spiselige bær i juli, rigtbærende. Meget sund sort.

Vokseplads: Sol til skygge. Ingen særlige krav til jordbund., trives både på ler-, sand- og humusjord. Anvendelse: busket, bæk og skovplantering.



Stikkelsbær, *Ribes uva-crispa* 'Larell'

Opret, kraftigvoksende busk. Kan på de helt unge skud have enkelte små torne, men på ældre grene ingen. Meget tidlig blomstring, april. Selvbestøvende. Saftige bær med mange kærner. Let sej, tyk skræl. Mørkerøde ved modenhed, juli.

Vokseplads: Sol, trives bedst på en muldet, ikke for svær jord.

Anvendelse: Busket og underplantering.

Bemærkninger: Efter høst skæres de gamle 3-4 årige skud bort ved jordoverfladen.



Fjeldrødsbær, *Ribes alpinum* 'Dima'

Kraftig, stiv, opret busk, ca. 1,5 m høj. er en sund hunklon. Løv mørkegrønt, trelappet, 5 cm langt og bredt, meget tidligt løvspring. Mange røde, spiselige bær.

Vokseplads: Sol-skygge, trives overalt, blot ikke på meget tør jord.

Anvendelse: Underplantering og hæk.



Blåbær, *Vaccinium corymbosum* 'Blue Crop'

Mellemhøj, robust, bredtvoksende busk. frugt meget store, lidt syrlige bær. Rigtbærende.

Vokseplads: Sol. Trives på sure jorde med en pH-værdi mellem 4,0 og 5,5.

Anvendelse: Busket og underplantering



Japansk Kvæde, *Chaenomeles japonica*

Tæt, tornet busk, indtil 1 m høj og bred, giver mange rodskud. Løv ægformet, 3-5 cm langt. Blomst cinnoberrøde æbleblomster i maj. Frugt små, runde, gule kvæder.

Vokseplads: Sol-halvskygge, nøjsom og hårdfør.

Anvendelse: Hæk og busket m.m. Tåler kraftig beskæring

Slyngplanter tilføjer en ny og anderledes dimension til beplantningen og etableres henholdsvis hvor, at der er en pergola eller op ad enkelte træer. De kan med deres krybende og klatrende karakter bruges både som bundddække og grønne vægge.






Klatrehortensia, *Hydrangea anomala ssp. petiolaris*

Indtil 2 m høj, bred busk med rodslående grene; plantet ved mur, træværk eller gamle træer klatrer den 4-7 m ved hjælp af luftrødder. Løv ægformet, blankt, grønt, 6-10 cm langt. Blomst hvide, indtil 25 cm brede skærme, juni-juli.

Vokseplads: Sol-skygge, normal-fugtig jord, ynder spagnum, hårdfør, tåler byluft.
Anvendelse: Fritvoksende, til bunddække og espalier.



Stedsegrøn Kaprifolie, *Lonicera 'henryi'*

Moderat-kraftig vækst, 3-4 m. Løv aflangt lancetformet, stedsegrøn, 4-9 cm langt. Blomst små, gulligrøde, juli-august. Sorte frugter.

Vokseplads: Sol-halvskygge. Fuldt hårdfør.
Anvendelse: Haver og parker / pergolaer



Alm. Vildvin, *Parthenocissus inserta*

Meget kraftig, rankende, 10-15 m, hæfter med slyngtråde. Løv femkøbet, mørkegrønt, ca. 10 cm langt, luerød høstfarve.

Vokseplads: Sol-let skygge, nøjsom og hårdfør.
Anvendelse: Til dækning af uskønne bygninger, mure og hegn.