



Har du et svært nedsat immunforsvar? Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination med et 3. stik mod COVID-19

Læs denne pjece, inden du bliver vaccineret

Anbefaling om vaccination med et 3. stik

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med et svært nedsat immunforsvar vaccineres med et 3. stik mod COVID-19.

Hvis du har et svært nedsat immunforsvar, kan du have nedsat effekt af vaccination mod COVID-19. Samtidig kan du have en øget risiko for et alvorligt forløb, hvis du bliver syg med COVID-19.

Et 3. stik vil forbedre og forlænge effekten af dine første vaccinationer, så du får en bedre beskyttelse.

Det er en læge, som vurderer, om du har en sygdom eller har fået en behandling, som gør, at du nu får tilbudt et 3. stik. Du vil blive vaccineret med samme vaccine-type, som du blev vaccineret med første gang.

Hvorfor skal jeg have et 3. stik?

Videnskabelige studier viser, at mange personer med et svært nedsat immunforsvar er bedre beskyttet mod COVID-19 efter et 3. stik. Studierne viser også, at personerne tåler 3. stik godt, og at de bivirkninger, de har oplevet efter vaccinationen, er de samme som ved 1. og 2. vaccination. Ingen personer i studierne har oplevet alvorlige bivirkninger efter 3. stik.

Når du skal vaccineres igen, kan du derfor forvente at opleve samme bivirkninger som ved dine tidligere vaccinationer, fx. feber, ondt i hovedet eller ømhed der, hvor du blev stukket.



Særlig grundig information

Vaccinerne er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til to stik. De er endnu ikke godkendt til 3. stik, men vi forventer, at godkendelsen vil komme i nærmeste fremtid. Du skal derfor have særlig information, inden du bliver vaccineret, og derfor er det vigtigt, at du læser denne pjece.

Sådan bliver du vaccineret

Du kan bestille tid til vaccination ved at logge på www.vacciner.dk med dit NemID. Her kan du se ledige tider, og hvorhenne du kan blive vaccineret.

Du kan også møde op i et vaccinationscenter helt uden tidsbestilling, når det passer dig.

For yderligere information

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du kan have omkring et 3. stik.

Læs mere på:

sst.dk/vaccination-svaert-nedsat-immunforsvar

Husk stadig de gode råd, som er med til at holde smitten på afstand



**Bliv hjemme og
bliv testet, hvis du
får symptomer**



Hold afstand



**Luft ud og skab
gennemtræk**



**Vask hænder tit
eller brug
håndsprit**



**Gør rent, særligt
på overflader som
mange rører ved**

