

# الآثار الجانبية لللقاح ضد كوفيد-19

جميع اللقاحات لديها آثار جانبية، وهذا ينطبق أيضاً على اللقاحات ضد كوفيد-19. وعموماً، فإن الأمر يتعلق بآثار جانبية خفيفة وعرضية. ونحن نعتبر اللقاحات آمنة جداً وموثقة بقدر جيد.

## أمثلة على الآثار الجانبية العادية

### ردود فعل عامة

- التعب
- صداع الرأس
- ألم العضلات والمفاصل
- القشعريرة
- ارتفاع خفيف في الحرارة

حين يتفاعل جهاز المناعة للجسد مع اللقاح، فهذه علامة طبيعية. إذا شعرت بهذه المضايقات المعروفة والعرضية، فلست بحاجة للاتصال بالطبيب.

### ردود فعل موضعية

- أوجاع واحمرار في المكان الذي توخز فيه

من الطبيعي الشعور برد فعل موضعي، حين المرور بالجلد والحقن باللقاح.

إذا شعرت بهذه المضايقات العرضية، فلا ينبغي أن تتصل بالطبيب. إذا شعرت مثلاً بحُمى خفيفة، فهذا تعبير عن أن جهاز المناعة يتفاعل مع اللقاح بالشكل المطلوب.

## أمثلة على الآثار الجانبية النادرة

- ردود فعل لحساسية شديدة
- صعوبة في التنفس
- طفح جلدي
- تورم في الوجه

كما هو الحال في اللقاحات الأخرى، فقد تحدث حالات نادرة من ردود الفعل بسبب الحساسية، بعد تلقي اللقاح ضد كوفيد-19. إذا حدثت لديك سابقاً ردود فعل بحساسية شديدة بعد تلقيك للقاح أو حقنة بعقار ما، فينبغي أن تتصل بطبيبك قبل أن تتلقى اللقاح ضد كوفيد-19.

يمكنك قراءة المزيد في [sst.dk/covid-vaccination](https://sst.dk/covid-vaccination) وفي [lmst.dk](https://lmst.dk)