



Spørgsmål og svar om vaccination mod COVID-19



Disse spørgsmål og svar er udarbejdet med henblik på at hjælpe medarbejdere, så de kan besvare spørgsmål ved pop-up vaccinationscentre..

Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination til unge?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, fordi vaccinen giver dig en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19. Vi anbefaler også vaccination, fordi:

- Jo flere der er vaccineret, jo bedre kontrol får vi med epidemien. Det betyder, at vi med vaccination mindsker smittespredningen, så vi kan beholde en almindelig hverdag.
- Alle kan blive syge af COVID-19. Det gælder også dig, som er ung og rask. Derudover dør nogle med senfølger som fx åndenød, træthed og hovedpine og mistet smags- og lugtesans i op til et halvt år efter, de har haft COVID-19.
- Du er med til at beskytte de mere sårbare borgere, fx ældre eller kræftpatienter, hvor vaccinen måske ikke virker så godt.

Hvad er forskellen på de to vacciner, som er i det danske vaccinationsprogram?

I det danske vaccinationsprogram er der to vacciner. Det er vaccinerne fra virksomhederne Pfizer-BioNTech og Moderna. Selvom der er tale om to forskellige vacciner, så er forskellen minimal. Begge vacciner er lige gode, sikre og effektive. Måske har du hørt allermest om vaccinen fra Pfizer-BioNTech. Det er fordi, det var en af de første vacciner, der kom til på markedet.

Hvor mange er vaccineret i dag?

I Danmark er mere end 4 millioner allerede blevet vaccineret mod COVID-19. På verdensplan er mere end 2 milliarder personer vaccineret.

Påvirker vaccinerne min fertilitet?

Vaccinerne påvirker ikke din fertilitet og din mulighed for at få børn. Det gælder for både piger og drenge.

Hvor godt beskytter vaccinerne?

Vaccinerne giver dig den bedste beskyttelse mod COVID-19 allerede 14 dage efter dit andet stik. Når du er vaccineret, er du også beskyttet mod Delta-varianten, som er markant mere smitsom og alvorlig end tidligere varianter af COVID-19.



Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, skal du udskyde din vaccination. Du kan godt blive vaccineret, hvis du fx blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse, men overvej altid, om du kunne have COVID-19.

Hvorfor skal jeg vaccineres, hvis jeg allerede har haft COVID-19 - jeg er vel immun?

Vi kan ikke være sikre på, at den immunitet, du har fået efter at have været smittet er ligeså god som den immunitet, du får af vaccinen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret, selvom du har haft COVID-19. Du kan blive vaccineret 1 måned efter endt sygdom med COVID-19.

Er vaccinerne testet godt nok?

Vaccinerne er grundigt testet og er godkendt i store studier med mange personer. Selvom vaccinerne mod COVID-19 er udviklet hurtigt, godkendes de efter samme standarder, som gælder for alle lægemidler i EU, både hvad angår kvalitet, effekt og sikkerhed. Det betyder, at vaccinerne er både sikre og effektive. Derudover bliver alle godkendte vacciner overvåget nøje af Lægemiddelstyrelsen. Det er helt almindelig procedure, og det gør man med alle vacciner og al slags medicin.

Hvorfor skal jeg vaccineres to gange?

Den fulde effekt af vaccinerne får du 1-2 uger efter dit andet stik, og derfor skal du vaccineres to gange.

Det er vigtigt, at du bliver vaccineret begge gange, så du får den bedste beskyttelse - også imod nye og mere smitsomme varianter.

Kan jeg få COVID-19, når jeg er vaccineret?

Vaccinerne giver dig en virkelig god beskyttelse, men der er en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er vaccineret. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 % effektive. Hvis du er vaccineret og bliver smittet med COVID-19, vil du dog få et mildere sygdomsforløb end personer, der ikke er blevet vaccineret.

Skal mine forældre give samtykke?

Hvis du er 15 år eller derover, kan du selv beslutte, om du vil vaccineres mod COVID-19. Hvis du er under 18 år er det en god idé, at du taler med dine forældre inden vaccinationen.

Hvad hvis jeg bliver dårlig, når jeg bliver vaccineret?

Efter du er blevet vaccineret, skal du vente 15 minutter på vaccinationsstedet, så en sundhedsperson kan holde øje med dig, hvis du skulle få en allergisk reaktion. Det sker dog sjældent. Det er normalt at opleve milde bivirkninger såsom feber og hovedpine, efter du er blevet vaccineret.